

مانومتری آنورکتال چیست؟

مانومتری آنورکتال آزمایشی است که میزان عملکرد رکتوم و اسفنکتر مقعد را اندازه گیری می کند. آزمایش مانومتری آنورکتال معمولاً برای افرادی که بی اختیاری مدفع، یبوست و بیماری هیرشپرونگ در کودکان انجام می شود.

آمادگی انجام آنورکتال

روز انجام دو تا سه ساعت قبل از عمل یک شیاف را استفاده کنید. می توانید این دارو را از داروخانه تهیه کنید.

از دو ساعت قبل از عمل چیزی نخورید و ننوشید.

می توانید داروهای مصری خود را تا دو ساعت قبل از عمل با جرعة های کوچک آب مصرف کنید.

برای مانومتری هیچ آرامبخشی داده نمی شود و می توانید رانندگی کنید.

حداقل 30 دقیقه قبل از زمان عمل در کلینیک تشریف داشته باشید.

لطفا کارت ملی، لیست داروهای مصری فعلاً شما، کولونوسکوپی و سایر سوابق قبلی را با خود به همراه داشته باشید.

در صورت نیاز به لغو نوبت یا تغییر زمان نوبت) زمانبندی مجدد، لطفا حداقل 24 ساعت قبل با شماره های کلینیک **54534000** یخشناسکوپی تماس بگیرید.

روش انجام آنورکتال چگونه است؟

برای انجام مانومتری آنورکتال، از شما خواسته می شود که گان یکبار مصرف بپوشید. سپس به پهلوی چپ خود دراز خواهید کشید. لوله کوچک و انعطاف پذیر به اندازه یک دماسنجه با یک بالون در انتهای آن (کاتتر) (وارد مقعد می شود. کاتتر به دستگاهی متصل است که فشار های اسفنکتر و مقعد و رکتوم را اندازه گیری می کند. در طول آزمایش، بالون کوچک متصل به کاتتر ممکن است در رکتوم باد شود تا ارزیابی شود.

در زمان های مختلف از شما خواسته می شود که به مقعد فشار دهید، استراحت کنید یا خود را نگه دارید و فشار عضله اسفنکتر مقعد در طول هر یک از این مانورها اندازه گیری می شود. برای فشردن، ماهیچه های اسفنکتر را سفت می کند، انگار که میخواهد از بیرون آمدن چیزی جلوگیری کند. برای فشار دادن یا پایین آوردن، بیمار فشار می آورد که گویی می خواهد مدفع کند.

خطرات مانومتری آنورکتال چیست؟ مانومتری آنورکتال یک روش ایمن و کم خطر است و بعید است که باعث ایجاد درد شود و عوراض آن نادر است.

نتیجه تست: نتایج مانومتری معمولاً چندین ساعت بعد در اختیار شما قرار میگیرد. لطفا در زمان اعلام شده با همه مدارک برای دریافت جواب در کلینیک حضور داشته باشید.